# QUELQUES NOUVELLES ESPÈCES DE L'AMIINAE (COL. CERANB.) DE L'AFRIQUE ORIENTALE

par le Dr. Stefan Breuning

### 1. Docohammus flavescens nov.

Stature allongée, les antennes assez robustes, éparsément frangées en dessous, si longues (3) ou distinctement moins longues (9) que le corps, le scape médiocrement long, peu fort, pourvu d'une cicatrice complète, très proéminente, le troisième article si long que le quatrième, un peu moins long que le scape, le onzième à peine atténué jusqu'au sommet; les yeux grossièrement facettés, fortement échancrés, les lobes inférieurs un peu plus longs que larges, cinq fois si long que les joues; le front beaucoup plus haut que large, un peu plus large qu'un des lobes inférieurs des yeux; le pronotum transversal, convexe, pourvu d'une petite épine pointue au milieu du bord latéral, les sillons transversaux sont fins et effacés sur le disque; quelques points fins sur les côtés du disque; l'écusson quadrangulaire, arrondi au sommet; les élytres sont allongés, convexes, arrondis au sommet, densément finement ponctués, les points très fins vers le sommet, leur base est finement granulée; la saillie prosternale très étroite, les cuisses légèrement claviformes.

Brun foncé, couvert d'une pubescence jaune de paille; sur les élytres une tache transversale grise vague en commun à la suture après l'écusson et une bande pareille peu large un peu avant le milieu (ces dessins gris très peu distincts); les tarses et les antennes couverts d'une pubescence gris clair. Long.  $10^{1}/_{2}$ -11 mm, Larg.  $3-3^{1}/_{2}$  mm.

LAMIINAE 205

Type 1 9 de Somalie italienne: Daua Parma, au Musée de Gênes, provenant des récoltes de Ruspoli. En outre 1 8 de Gurar également au Musée de Gênes (leg. Toncker).

## 2. Mallonia patrizii nov.

Très proche de l'albosignata Chevrl. du Natal, mais: une touffe de poils aussi au sommet du sixième et septième article antennaires, le front finement ponctué, le pronotum non granulé, ne pourvu que d'une bosse peu indiquée de chaque côté du milieu; pronotum et élytres sans bandes noires, mais la partie discale entre les deux taches blanches de chaque élytre couverte d'une pubescence brun plus foncé que le reste; la tache prémédiane blanche des élytres beaucoup plus petite, n'envoyant vers la suture qu'un mince rameau pointu, qui correspond au bord postérieur de la tache chez albosignata; une petite tache blanche sur les côtés du quatrième et une un peu plus grande sur ceux du cinquième segment abdominal. Long.: 23 mm, Larg.: 8 mm.

Type 1 9 de Somalie italienne: Giuba, Belet Amin au Musée de Gênes, provenant des récoltes de Patrizi.

# 3. Tetraulax pictus nov.

Stature relativement trapue, les lobes inférieurs à peine deux fois plus longs que les joues, le disque du pronotum pourvu de 4 sillons longitudinaux, dont les 2 médians courbés, formant un dessin triangulaire à angles postérieurs arrondis et la partie étroite en avant; le bord latéral du pronotum fortement arrondi mais sans tubercule, les élytres légèrement tronqués au sommet.

Noir, couvert d'une pubescence brun olivâtre mêlé de gris clair, l'écusson d'une telle gris claire; sur chaque élytre une bande transversale gris blanchâtre à la base extrème, une autre pareille large, ondulée prémédiane et une tache pareille dilacérée discale préapicale; ces dessins élytraux bordés en partie de brun noirâtre; les côtés des sterna couverts d'une pubescence gris blanchâtre, le bout apical des tibias intermédiaires et postérieures et les tarses d'une telle brun foncée; les antennes couvertes d'une telle gris blanchâtre, le tiers apical des articles dès le quatrième d'une telle brune. Long.: 7 mm, Larg.:  $2^{1}/4$  mm.

Type 1 9 de Somalie italienne: Belet Amin, au Musée de Gênes, provenant des récoltes de Patrizi.

## 4. Eunidia albisparsa nov.

Très proche de caffra Fahr., mais le troisième article des antennes étiré en une épine apicale plus pointue, les élytres mouchetés de très petites taches blanches, les jambes et antennes brun foncé, les articles antennaires dès le quatrième ne annelés de gris qu'à la base. Long. 5 mm, Larg.  $1 \frac{1}{2} \text{ mm}$ .

Type de Zanzibar, au Musée de Gênes, provenant des récoltes de Raffray.

### 5. Eunidia setosa nov.

Proche de socia Gah., mais le scape distinctement plus long que le quatrième ou cinquième article antennaire, les antennes assez densément frangées en dessous, les élytres arrondis au sommet. Les élytres marbrés par place aussi de brun foncé, les articles antennaires non rembrunis au sommet. Long. 5 mm, Larg. 1 ½ mm.

Type de Somalie italienne: Belet Amin, au Musée de Gênes, provenant des récoltes de Patrizi.